

## Besleme ile döl verimi arasındaki ilişki

Hayvanları aşırı veya yetersiz besleme durumunda besi kısırılığı adı verilen döl verimi bozuklukları ile gebe kalmada sıkıntılar ortaya çıkar.

Yetersiz beslenen düveler cinsel olgunluğa geçemezler, kızgınlık gösteremezler ve damızlıkta kullanma ağırlığına ulaşamazlar.

Aşırı beslenen düvelerde sağım süresi azalır, süt üretiminde %15 azalma görülür.


Doğru beslenen düveler yaklaşık 24 aylık iken ilk doğumlarını yaparlar.

Düvelerin aşırı, yetersiz ya da dengesiz beslenmeleri ileriki dönemlerde döl ve süt verimlerini olumsuz etkiler.

**!!** Mecbur kalınmadıkça düvelere dane yemler, fabrika yemi ve silaj gibi enerjice zengin yemler verilmemelidir.

Çünkü aşırı besleme yumurtalık kistlerine ve döl verimi sorunlarına yol açar.

**□** Aşağıdaki resimde aşırı beslenmiş bir düve görmekteyiz. Düve mi yoksa kasaplık dana mı siz karar verin!



Atatürk Üniversitesi  
Ziraat Fakültesi  
Zootekni Bölümü

## Damızlık Düvelerin Beslenmesi



## Düve Yetiştiriciliği

Düve yetiştirmede amaç, ileride döl ve süt verimini düşürmeyecek şekilde hayvanların tüm besin madde ihtiyaçlarını en düşük maliyetle karşılamaktır.

Düvelerinizi aşırı, yetersiz ya da dengesiz beslenmeniz ileriki dönemlerde döl ve süt verimlerini olumsuz etkileyecektir.


!! Bu nedenle mecbur kalmadıkça düvelere dane yemler, fabrika yemi ve silaj gibi enerjice zengin yemler vermeyin.

### Dört aydan bir yaşına kadar beslenme

Kaba yemi serbest, dane yem ise sınırlı verebilirsiniz.

Bu dönemde genç dişi sığırlar, iyi kaliteli merada besin madde ihtiyacını karşılayabilir.

Mera orta kalitede ise, düşük protein içeren ilave kuru ot ve sınırlı miktarda dane yem verin.



### Bir yaşından itibaren beslenme

Eğer iyi kaliteli kaba yem temin edebiliyorsanız, düvelerinizi bir yaşından sonra vitamin ve mineral takviyesi yaparak sadece kaba yemle besleyebilirsiniz.

Eğer düveler günde 750 gramın altında canlı ağırlık artışı sağlıyorsa o zaman fabrika yemi takviyesi yapmanızda yarar var.

Günde yaklaşık 2 kilogram fabrika yemi verebilirsiniz.

Düveler ilk kızgınlıklarını ergin canlı ağırlıklarının %40'ına ulaştıklarında gösterirler. Bu genelde 12 aylıktan öncedir.

!! Ancak; fosfor veya vitamin A yetersizliği olan düveler kızgınlık göstermezler.

Bu dönemde yavaş büyüyen veya yetersiz beslenen düveler kızgınlık göstermedikleri gibi, aşırı beslenerek yağlanan düveler ise döl tutmazlar.

Meme gelişiminin en yüksek olduğu 4 – 9 aylar arasında düvelerinizi aşırı beslerseniz et meme gelişir ve süt verimleri düşük olur.



### Doğumdan önceki son iki ayda beslenme

Bu dönemdeki besleme ilk yılki süt verimlerini etkiler. Kural olarak, doğumdan 6 hafta önce canlı ağırlığın % 1'i kadar fabrika yemi günlük verilmeye başlanır.

!! Fakat bu yem verilirken hayvanın vücut yapısına ve görünümüne dikkat etmek gerekir.

» Çünkü doğuma yağlandırılmış olarak giren düvelerde çeşitli doğum güçlükleri ortaya çıkar.

Bir düveye yapabileceğiniz en büyük kötülük onu aşırı beslemektir.

